



数字

5-HT3受容体拮抗薬 137

欧文

A ~ G

A.S.P.E.Nガイドライン
..... 138
CDDP 137
ceiling effect 61
COX-2選択阻害薬 62
death rattle 122
DIC 159
disseminated intravas-
cular coagulation 159
EBM 116
GIST 115

I ~ P

ICU症候群 152
Lyrica® 97
NBM 116
NMDA受容体拮抗薬 ... 98
N-methyl-D-aspartic
acid受容体拮抗薬 ... 98
NRS 74
NSAIDs 62, 93
NST 136
NSTチーム 136
Numeric Rating Scale ...
..... 74
nutrition support team
..... 136
oncologic emergency
..... 158

Patient Controlled
Analgesia 73
PCA 73
PCA用の持続注入器 150
performance status 112
PS 112

S ~ W

selective serotonin reup-
take inhibitor 95
serotonin noradrenaline
reuptake inhibitor 95
SGA 139
SNRI 95
SSRI 95
subjective global
assessment 139
VAS 74
Visual Analog Scale 74
WHOの癌性疼痛ガイド
ライン 59, 61
WHO三段階除痛ラダー
..... 59, 61

和文

あ行

「あ」:『挨拶をする』... 32
悪液質 121, 136
悪性胸水 126
悪性腹水 131
アセスメント 78
アセトアミノフェン ... 62
アトラウマテック針 ... 112
アナフラニール® 95

アミトリプチリン 95
アルチバ® 72
アレピアチン® 97
安静時の呼吸困難 ... 122
安楽死 171
「い」:『医療者であること
を伝える』 34
意識水準の低下 153
医師法21条 168
異常感覚を伴う持続する
痛み 95
異状死 168
痛みのアセスメント
..... 19, 77
痛みのコントロール ... 18
イフェンプロジル 98
イミプラミン 95
医療事故 37
医療の質を保証 13
医療不信 34
医療面接のあいうえお 30
医療用麻薬 81
イレッサ® 115
「う」:『訴えをきく』... 36
「え」:『援助』 38
栄養サポートチーム 136
塩酸ケタミン 98
「お」:『オープンクエスチ
ョン』 39
オキシコドン 65
オキシコンチン®... 70, 90
オキノーム 70
オクトレオチド 94
オクトレチド 113
オピオイド 66, 93

オピオイドの換算の目安
..... 82
オピオイドローテーション
..... 69, 70, 82
オプソ 70

か行

ガイドライン 43, 77
化学療法 114
かきくけこ法 43, 44
寡動 153
ガバベン® 97
ガバベンチン 97
身体の痛み(のマネジメン
ト) 58
カルバマゼピン 96
感覚遮断 152
環境を整える 44
患者中心の医療 13
乾性の咳 126
癌性リンパ管症 121
緩和ケア 12
きくこと 44, 47
キシロカイン® 97
拮抗性オピオイド 85
気道狭窄 121
ギャパロン® 94
急性の痛み 60
急性副腎不全 159
強オピオイド 65
共感的対応 ... 23, 51, 52
胸腔穿刺 127
胸水 122, 126
筋痙攣の痛み 94
くも膜下鎮痛法 109
グリーフィング 173
グリベック® 115
クロナゼパム 97
クロミプラミン 95
経済性 91
経皮的コルドトミー ... 109

血清アルブミン値 ... 139
ゲフィチニブ 115
抗うつ薬 95
高カルシウム血症 ... 161
抗癌薬 114
抗コリン薬 94
抗精神病薬 156
向精神薬 156, 173
拘束 156
興奮 153
後方アプローチ 108
硬膜外ブロック 109
抗ムスカリン薬 93
ゴーストビル 90
呼吸困難(感) 119
告知 42
心の痛み 21
姑息的治療 ... 106, 110
姑息的照射 110
骨転移痛 94
コミュニケーションスキル
..... 28
根治的放射線治療 ... 110

さ行

酸化マグネシウム 68
三環系抗うつ薬 95
三叉神経ブロック ... 108
ジアゼパム 94
シクロオキシゲナーゼ... 62
自殺 173
自殺未遂 23
シスプラチン 137
自制内 78
持続注入器 150
持続皮下注 146
湿性の咳 126
死の受容 164
死別のケア 165
死別体験 167
社会的痛み 21

弱オピオイド 63
臭化ブチルスコポラミン
..... 113
終末期の死前喘鳴 ... 122
主観的包括的評価 ... 139
消化管閉塞の痛み 94
上大静脈症候群
... 111, 113, 121, 159
静脈留置針 133
食事 135
徐放性オキシコドン ... 70
神経障害性(神経因性)
疼痛 94
神経ブロック 107
滲出液 127
心タンポナーデ 159
睡眠遮断 152
スクリーニング 139
スコポラミン
..... 113, 122, 123
ステロイド 98
ステント 113
スピリチュアルな痛み
..... 21
スピリチュアルペイン
..... 25
スピロノラクトン ... 124
精神的痛み 21
生物としての死 165
脊髄圧迫 160
脊椎の骨折 113
脊椎への転移 110
セデーション 125
セルシン® 94
セレネース® 68, 79
セロクラール® 98
セロトニン・ノルアドレナ
リン再取り込み阻害薬
..... 95
全人的な痛み 21
選択的セロトニン再取り込
み阻害薬 95
センノシド 68

前方アプローチ	108
せん妄	152
早発性下痢	138
ソマトスタチン	94
尊厳死の宣言書	171

た行

対症照射	110
第2世代薬	156
タキサン系	128
タルク	128
ダントリウム®	94
ダントロレン	94
チーム医療	12, 69
鎮静	125
鎮痛補助薬	93, 95
沈黙	51
低酸素血症	119
テーラーメイド	115
デキサメタゾン	98
テグレトール®	96
デパケン®	97
デュロテップ®パッチ	70, 88
疼痛をコントロール	74
トータルペイン	21
トフラニール®	95
トリプタノール®	95

な～は行

内臓神経ブロック	108
ナロキソン	65, 89
認知症	154
脳死	165
脳転移	160
ノバミン®	68, 79
ハイスコ®	122, 123
バクロフェン	94
バルプロ酸ナトリウム	97
ハロペリドール	68, 156
パンコースト腫瘍	111

非オピオイド鎮痛薬	61
皮下注	145
ピシバニール®	128
非ステロイド性抗炎症薬	93
ビスホスフォネート	94
悲嘆	164
病的骨折	113
開かれた質問	39
フェニトイン	97
フェノールブロック	109
フェンタニル	65, 68, 72
フェンタニルパッチ	70, 88
不穏	153
腹腔神経叢ブロック	108
副作用	68, 79
腹水	122, 131
腹水穿刺	132
ブプレノルフィン	64
プライマリケア	12
プルゼニド®	68
フルルビプロフェンアキセチル	61
プレアルブミン	140
プレオマイシン	128
プレガバリン	97
プレゼンテーション	116
プロクローラベラジン	68
フロセミド	124
プロンプトンカクテル	75
分子標的薬剤	115
ベタメタゾン	98
ペンタジン®	85
ペンタゾシン	64
ホルマリン	112

ま～や行

麻薬	58, 63, 173
麻薬及び向精神薬取締法	173

慢性の痛み	60
味覚障害	138
看取り	166
メキシチール®	97
メキシレチン	97
メシル酸イマチニブ	115
メトクロプラミド	137
モルヒネ	65, 67
門脈塞栓	159
有効限界	61
有痛性筋攣縮	94
輸液	135
癒着剤	128, 133
予期悲嘆(のケア)	166
予後告知	14, 26

ら～わ行

ラキソベロン	68
理解の対応	23, 52
リドカイン	97
リドカインテスト	97
リビング・ウィル	171
リボトリール®	97
リン酸コデイン	63
臨終時の家族ケア	166
レスキュー	73, 82, 84
レスキュー用オキシコドン	70
レスキュー用モルヒネ	70
レミフェンタニル	72
労作時の呼吸困難	122
濾出液	127
ロールプレイ	54
ロピオン®	62
悪い知らせを伝える (方法)	43, 44