

## 和 文

### あ行

|                    |        |
|--------------------|--------|
| アカシジア              | 135    |
| アクシデント             | 181    |
| アスピリン              | 82     |
| アスピリン喘息            | 52     |
| アセトアミノフェン          | 122    |
| アドヒアランス            | 172    |
| アルコール過敏症           | 128    |
| アレルギー反応            | 56     |
| 安全キャビネット           | 72     |
| アントラサイクリン系         | 128    |
| アンパック®坐薬           | 134    |
| アンパック®注            | 134    |
| イコサペント酸エチル         | 82     |
| 維持投与量              | 36     |
| イチョウ葉エキス           | 81     |
| 一般名                | 68     |
| 一般用医薬品（OTC医薬品）     | 147    |
| 医薬品安全管理責任者         | 11, 14 |
| 医薬品医療機器総合機構        | 74     |
| 医薬品・医療機器等安全性情報報告制度 | 78     |
| 医薬品採用              | 14     |
| 医薬品副作用被害救済制度       | 78     |
| 医療安全管理体制           | 8      |
| 医療経済               | 187    |
| 医療事故               | 8      |
| 医療事故情報             | 11     |
| 医療事故情報収集等事業        | 8      |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 医療メディエーター         | 194      |
| 医療用麻薬             | 132      |
| 胃痙                | 143      |
| インシデント            | 181      |
| インシデントレポート収集システム  | 182      |
| インスリン             | 48       |
| インスリン・スライディングスケール | 81       |
| インスリン製剤           | 47       |
| インスリン抵抗性改善薬       | 101      |
| インラインフィルター        | 65       |
| ウェルニッケ脳症          | 138      |
| 運動機能障害            | 114      |
| 栄養                | 137      |
| エダラボン             | 113      |
| エラープルーフ化          | 193      |
| 嚥下障害              | 114      |
| オーダーリングシステム       | 26       |
| オキシコドン            | 134      |
| オキシコンチン®錠         | 134      |
| オキノーム®散           | 134      |
| お薬手帳              | 157, 179 |
| 悪心、嘔吐             | 129      |
| オプソ®内服液           | 134      |
| オレンジブック（品質再評価結果）  | 15       |
| 温度や遮光             | 17       |

### か行

|        |    |
|--------|----|
| 外観変化   | 59 |
| 外観類似薬剤 | 31 |

|                  |     |
|------------------|-----|
| 改訂MDRD簡易式        | 108 |
| 化学的配合変化          | 59  |
| 化学療法委員会          | 68  |
| 隔壁の開通忘れ          | 47  |
| 可塑剤              | 65  |
| カディアンカプセル®・スティック | 134 |
| ガドリニウム           | 167 |
| カリウム製剤           | 46  |
| 過量充填             | 70  |
| 過量投与             | 135 |
| 加齢               | 124 |
| 簡易懸濁法            | 144 |
| 簡易懸濁法の手技         | 145 |
| 感覚機能             | 126 |
| 肝機能障害            | 43  |
| 間歇性跛行            | 112 |
| 看護記録             | 172 |
| 看護師              | 173 |
| 肝細胞障害型           | 43  |
| 肝疾患に対する栄養管理      | 139 |
| 患者インタビュー         | 40  |
| がん性疼痛治療          | 132 |
| 肝性脳症             | 139 |
| 感染症              | 90  |
| カンファレンス          | 174 |
| 冠攣縮性狭心症          | 95  |
| 緩和ケア             | 179 |
| 規格               | 39  |
| 気管支喘息            | 52  |
| 疑義照会             | 40  |
| 救急カート            | 171 |

|                                                      |         |                        |               |             |          |
|------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------|-------------|----------|
| 救急領域                                                 | 159     | 検査所見                   | 172           | 在宅医療        | 176      |
| 吸収                                                   | 49      | 検査値所見                  | 74            | 嘔声          | 86       |
| 急性中毒                                                 | 147     | 抗悪性腫瘍薬                 | 67, 80, 127   | サプリメント      | 51       |
| 急性中毒情報ファイル                                           | 147     | 抗悪性腫瘍薬曝露               | 71            | 坐薬          | 122      |
| 吸着                                                   | 65      | 降圧薬                    | 80            | サルボグレラート塩酸塩 | 82       |
| 吸入ステロイド                                              | 123     | 抗菌薬                    | 90            | ジアゼパム       | 122      |
| 休業期間                                                 | 36, 82  | 口腔内カンジダ症               | 86            | ジェネリック医薬品   | 15, 33   |
| 虚血性心疾患                                               | 94      | 抗血小板療法                 | 94            | 時間依存性       | 91       |
| 禁忌薬剤                                                 | 52      | 抗血栓薬                   | 80, 125       | 持効型         | 102      |
| 緊急安全性情報（ドクターレター）                                     | 74      | 抗血栓薬の術前休業期間            | 82            | 持参薬         | 155, 171 |
| 筋肉内注射                                                | 57      | 高血糖                    | 141           | システム構築      | 45       |
| 空気感染                                                 | 92      | 甲状腺ブロック                | 170           | 自然奇形発生率     | 117      |
| 暮らしの質                                                | 177     | 向精神薬                   | 22, 80        | ジピリダモール     | 82       |
| クリーンベンチ                                              | 72      | 酵素誘導・阻害                | 50            | 収着          | 65       |
| クロピドグレル                                              | 82, 114 | 口内炎                    | 129           | 重篤化回避       | 186      |
| 経口糖尿病薬                                               | 80      | 後発医薬品                  | 15            | 重複投与        | 157      |
| 経口避妊薬                                                | 81      | 抗不整脈薬                  | 80, 99        | 手術・処置前患者    | 80       |
| 経静脈栄養法                                               | 138     | 高齢者                    | 124, 176      | 腫瘍融解症候群     | 131      |
| 経腸栄養剤                                                | 144     | 国際一般名                  | 68            | 消毒薬         | 92       |
| 経腸栄養法                                                | 138     | 国際共同治験                 | 151           | 情報共有        | 182      |
| 経鼻胃管法                                                | 142     | 国際標準プロトロンビン時間比（PT-INR） | 98            | 静脈血栓塞栓症     | 81       |
| 経鼻栄養法                                                | 142     | 個人差                    | 124           | 静脈内注射       | 57       |
| 経皮内視鏡的胃瘻造設術（PEG：percutaneous endoscopic gastrostomy） | 142     | コミュニケーション              | 126, 171, 173 | 初期症状        | 74       |
| 劇薬                                                   | 24      | コミュニケーションエラー           | 174           | 初期投与量       | 36       |
| 血液凝固阻止剤                                              | 156     | 混合型肝障害                 | 43            | 食事療法        | 141      |
| 血液凝固能                                                | 98      | 混合製剤                   | 102           | 食品          | 51       |
| 血液透析（hemodialysis：HD）                                | 110     | コントローラー                | 122           | 食品アレルギー     | 172      |
| 血液毒性                                                 | 43      | コンフリクト                 | 194           | 処方鑑査        | 30       |
| 血栓溶解薬                                                | 16      | 根本原因分析                 | 189           | 徐放錠         | 39       |
| 下痢                                                   | 130     |                        |               | 処方日数        | 34       |
| 健康被害                                                 | 78      |                        |               | シリンジポンプ     | 160      |
| 言語障害                                                 | 114     |                        |               | シロスタゾール     | 82, 114  |
| 言語聴覚士                                                | 115     |                        |               | 腎疾患に対する栄養管理 | 139      |
|                                                      |         |                        |               | 新人教育        | 187      |
|                                                      |         |                        |               | 心腎連関        | 107      |
|                                                      |         |                        |               | 腎排泄         | 49       |

## さ行

|          |        |
|----------|--------|
| 剤形       | 40     |
| 在庫場所     | 17, 32 |
| 最小発育阻止濃度 | 91     |

|                            |          |                |         |                |         |
|----------------------------|----------|----------------|---------|----------------|---------|
| 心不全                        | 54       | 治験             | 151     | 投与時間           | 56      |
| 診療録                        | 172      | 治験依頼者          | 152     | 投与速度           | 56      |
| 睡眠薬                        | 124      | 治験コーディネーター     | 151     | 投与方法           | 57      |
| ステロイド                      | 85       | 治験実施計画書        | 151     | 投与量            | 40      |
| ステロイド外用剤                   | 87       | 治験薬            | 151     | 特異的な有害事象       | 44      |
| ステロイド性骨粗鬆症                 | 87       | 治験薬管理者         | 152     | 特殊な飲み方         | 157     |
| ステロイド漸減                    | 89       | チトクローム P450    | 50      | 特定生物由来製品       | 24, 164 |
| ステロイド補充療法（ステロイドカ<br>バー）    | 81       | 注意喚起           | 46      | 特に安全管理が必要な医薬品  | 46      |
| ステント留置術                    | 94       | 中心静脈ライン        | 162     | 毒薬             | 24      |
| スペクトラム                     | 90       | 中枢作用薬          | 124     | 毒薬・向精神薬        | 164     |
| スライディングスケール                | 104      | チューブ閉塞         | 142     | トライエージ® DOA    | 148     |
| 生検                         | 82       | 長期投与           | 35      | ドラッグ・ラグ        | 151     |
| セーフティマネジメント                | 10       | 調剤業務           | 30      |                |         |
| 脊髄腔内注射                     | 57       | 調剤支援システム       | 28      | <b>な行</b>      |         |
| 接触感染                       | 92       | 調剤済麻薬廃棄届       | 21      | 内視鏡検査          | 168     |
| 先発医薬品                      | 33       | 調剤ミス           | 30      | 生ワクチン          | 88      |
| せん妄症状                      | 125      | 調剤ミス防止対策       | 29      | ニコチネル® TTS     | 167     |
| 造影剤                        | 167      | 超速効型           | 102     | ニコチン           | 149     |
| 造影剤腎症                      | 168      | 鎮痛補助薬          | 135     | 二次性副甲状腺機能亢進症   | 110     |
| 相対的乳児薬物摂取量                 | 117      | ツアクション調剤       | 32      | 二相性製剤          | 102     |
| 早朝高血圧                      | 96       | 手洗い            | 92      | ニトロダーム® TTS    | 167     |
| 組織型プラスミノゲンアクチベータ<br>(t-PA) | 113      | 低血糖            | 54, 104 | 日本中毒情報センター     | 147     |
| 速効型                        | 102      | 低血糖症状          | 48      | 日本病院薬剤師会ホームページ | 186     |
| 速効型インスリン分泌促進薬              | 101      | 低 Na 血症        | 138     | 尿タンパク          | 108     |
|                            |          | 適応             | 39      | 妊娠糖尿病          | 103     |
|                            |          | 適応症            | 39, 40  | 認知機能           | 126     |
| <b>た行</b>                  |          | デュロテップ® MT パッチ | 22, 134 | 認知機能障害         | 114     |
| 代謝                         | 49       | 電子カルテ          | 45      | 脳梗塞            | 113     |
| 耐性菌                        | 90       | 点滴静脈内注射        | 57      | 脳梗塞による後遺症      | 114     |
| 代替薬                        | 155, 157 | 転倒転落           | 125     | 濃度依存性          | 91      |
| 体表面積                       | 69       | 糖尿病            | 54      | 飲み残し           | 177     |
| タバコの誤飲                     | 149      | 糖尿病合併妊娠        | 103     | 飲み忘れ           | 179     |
| 胆汁うっ滞型肝障害                  | 43       | 動脈内注射          | 57      |                |         |
| チーム医療                      | 174      | 投与間隔           | 36      | <b>は行</b>      |         |
| チクロピジン塩酸塩                  | 43, 82   | 投与期間           | 35      | 配合変化           | 59, 162 |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 配置場所                            | 32           |
| ハイリスク薬                          | 46, 157, 164 |
| ハインリッヒの法則                       | 182          |
| 白衣高血圧                           | 96           |
| パシーフ® カプセル                      | 134          |
| パピナール®                          | 134          |
| 針刺し事故                           | 93           |
| パルス療法                           | 87           |
| ピーガード® 錠                        | 134          |
| 皮下注射                            | 57           |
| ビグアナイド薬                         | 101          |
| ビスホスホネート製剤                      | 87           |
| 非定型抗精神病薬                        | 54           |
| 皮内注射                            | 57           |
| 非pH依存性配合変化                      | 59           |
| 飛沫感染                            | 92           |
| ヒヤリ・ハット                         | 181          |
| ヒヤリ・ハット報告                       | 11           |
| ヒューマンエラー                        | 185, 191     |
| 病棟業務                            | 171          |
| 微量アルブミン                         | 108          |
| フェンタニル                          | 134          |
| フェンタニル® 注射液                     | 134          |
| 不具合・有害事象                        | 168          |
| 副腎皮質ホルモン剤                       | 80           |
| 副腎不全                            | 89           |
| 複数規格・剤形                         | 32           |
| 腹膜透析 (peritoneal dialysis : PD) | 110          |
| 服薬カウンセリング                       | 120          |
| 服薬状況                            | 171          |
| 普通錠                             | 39           |
| 物理的配合変化                         | 59           |
| ブドウ糖                            | 104          |
| プラセボ                            | 152          |
| ブルーレーター                         | 74           |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| ブレアボイド               | 186    |
| ブレペノン® 注 100 mg シリンジ | 134    |
| 分布                   | 49     |
| 閉塞隅角緑内障              | 52     |
| 併用禁忌                 | 50, 67 |
| ヘパリン                 | 82     |
| 返品薬                  | 33     |
| 補正Ca値                | 109    |
| ポリープ切除               | 82     |
| ポリ塩化ビニル              | 65     |
| ポリオキシエチレンヒマシ油        | 66     |
| ポリソルベート              | 66     |

## ま行

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| マスク                                         | 93      |
| 末期腎不全                                       | 107     |
| 末梢静脈栄養法                                     | 138     |
| 末梢動脈性疾患 (peripheral arterial disease : PAD) | 112     |
| 麻痺                                          | 114     |
| 麻薬                                          | 19, 164 |
| 麻薬及び向精神薬取締法                                 | 19, 22  |
| 麻薬事故届                                       | 22      |
| 麻薬処方せん                                      | 21      |
| 麻薬施用者免許                                     | 19      |
| 麻薬廃棄届                                       | 21      |
| 満月様顔貌                                       | 89      |
| 慢性腎臓病                                       | 107     |
| 未然回避                                        | 186     |
| 無作為                                         | 152     |
| 名称類似薬剤                                      | 30      |
| 持ち越し効果                                      | 124     |
| モルヒネ                                        | 134     |
| モルヒネ® 塩酸塩注射液                                | 134     |
| モルヒネ® 錠・末                                   | 134     |

|          |     |
|----------|-----|
| モルベス® 細粒 | 134 |
|----------|-----|

## や行

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 薬学的患者ケア      | 186              |
| 薬剤管理指導業務     | 172              |
| 薬事委員会        | 14               |
| 薬品棚          | 48               |
| 薬物血中濃度モニタリング | 91               |
| 薬物動態         | 57               |
| 薬物動態学的相互作用   | 49               |
| 薬業連携         | 157              |
| 薬力学的相互作用     | 50               |
| 薬局ヒヤリ・ハット事例  | 13               |
| 有害事象         | 15, 74, 124, 129 |
| 有効期限         | 16               |
| 輸液フィルター      | 65               |
| 輸液ポンプ        | 160              |
| 譲受け, 譲渡し     | 19               |
| 用量—作用曲線      | 67               |
| ヨード造影剤       | 167              |
| 与薬カート        | 173              |

## ら・わ行

|              |     |
|--------------|-----|
| ラロキシフェン      | 81  |
| 理学療法士・作業療法士  | 115 |
| リスクマネジメント    | 10  |
| リユープリン®      | 39  |
| 緑内障          | 52  |
| 理論的薬剤摂取量     | 117 |
| 臨床検査結果に及ぼす影響 | 168 |
| 臨床試験         | 151 |
| レジメン         | 68  |
| レリーバー        | 122 |
| 瘻管法          | 142 |
| ワクチン類        | 16  |

ワルファリン…………… 82, 98, 114

## 欧 文

### A～D

ACTIQ®……………134  
 Augsberger 式……………121  
 BMS (bare metal stent) …… 94  
 CKD (chronic kidney disease)  
 ……………107  
 Cockcroft-Gault 式……………108  
 CRC……………151  
 daily dose 法…………… 98  
 DEHP…………… 65  
 DES (drug eluting stent) …… 94  
 DHA…………… 81  
 DPC…………… 15, 156  
 DPP-4 阻害薬……………101

### E～M

EBM……………172  
 EPA…………… 81  
 FTU (finger-tip unit) …… 87  
 GCP……………151  
 Harris-Benedict の式……………137  
 IARC…………… 70  
 IDPN (intradialytic parenteral  
 nutrition)……………139  
 K 含有製剤…………… 56  
 MIC…………… 91  
 MRI……………167  
 MS コンチン®錠……………134  
 MS ツワイスロン® カプセル ……134

### N～O

Nadir……………129  
 NIOSH…………… 70  
 Non-Dipper 型高血圧…………… 96  
 NPC/N (non protein calorie/  
 nitrogen)……………137  
 NPH 製剤……………102  
 NSAIDs……………125  
 N-アセチルシステイン液……………149  
 OTC 医薬品…………… 51, 149

### P～V

PCI…………… 94  
 PD (pharmacodynamics) …… 91  
 PDCA サイクル……………193  
 pH 依存性配合変化…………… 59  
 PK (pharmacokinetics) …… 91  
 PVC…………… 65  
 SHEL モデル……………189  
 SU 薬……………101  
 TDM…………… 91  
 Von Harnack 表……………121

## 数字・その他

3 文字検索…………… 26  
 4M-4E マトリックス……………188  
 $\alpha$ -グルコシダーゼ阻害薬……………101