

索引

INDEX

◆ 数字 ◆

| | |
|--------------------------|-----|
| 5-FU | 169 |
| 5-HT ₃ 受容体拮抗薬 | 159 |

◆ 欧文 ◆

A

| | |
|-----------------------------|-----|
| ACP (Advance care planning) | 272 |
| AD (Advance directive) | 272 |

B・C

| | |
|----------|---------------|
| β遮断薬 | 321 |
| Bad news | 224, 232, 234 |
| CD腸炎 | 171 |
| CPT-11 | 168 |

E・H

| | |
|--|---------------|
| EGFR阻害薬 | 169 |
| EGFRチロシンキナーゼ阻害薬 | 184 |
| EUS-CPN | 308 |
| Hope for the best, but prepare for the worst | 232, 268, 274 |

K・L

| | |
|------------|-----|
| KM-CART | 197 |
| L-カルボシステイン | 207 |

M

| | |
|----------------------------|----|
| MST (median survival time) | 14 |
| MSコンチン [®] 錠 | 86 |

| | |
|-----------------------------|----|
| MS ツワイスロン [®] カプセル | 86 |
|-----------------------------|----|

N

| | |
|-----------|--------------|
| NaSSA | 151 |
| NGチューブ | 173 |
| NK1受容体拮抗薬 | 159 |
| NRS | 31 |
| NSAIDs | 40, 178, 288 |

O

| | |
|---------------------|----------|
| O ₂ 投与 | 205 |
| Ommaya-Reservoir留置 | 201 |
| Oncogenic Emergency | 210, 213 |

P

| | |
|------------------------------------|-----|
| palliative oncologist | 14 |
| PEG | 174 |
| performance status | 18 |
| PPI (Palliative Prognostic Index) | 270 |
| PPS (Palliative Performance Scale) | 271 |
| PS低下 | 154 |
| PTEG | 174 |
| PTHrP | 310 |

R

| | |
|----------------|----------|
| RANKL阻害薬 | 178, 210 |
| Realistic hope | 232, 241 |

S

| | |
|--------|----------|
| SHARE | 224, 276 |
| SIADH | 310 |
| SN-38 | 169 |
| SNRI | 118, 150 |
| SNRI作用 | 82 |

| | |
|----------------|----------|
| spiritual pain | 278 |
| SSRI | 150, 320 |
| SVC症候群 | 206 |

T

| | |
|------------|-----|
| total pain | 12 |
| TS-1 | 169 |

U

| | |
|------------------|-----|
| UFT | 169 |
| UGT1A1 | 169 |
| Unrealistic hope | 232 |

V

| | |
|---------|-----|
| VAS | 31 |
| VPシャント術 | 200 |
| VRS | 31 |

W

| | |
|---------------------------|----|
| WHO方式がん疼痛治療法の3段階 除痛ラダー | 28 |
| WHO方式がん疼痛治療法の3つの目 標 | 24 |
| WHO方式がん疼痛治療法の5つの原 則 | 26 |

◆ 和 文 ◆

あ

| | |
|----------------------|----------|
| アービタックス [®] | 184 |
| アカシジア | 151, 320 |
| 悪臭 | 187 |
| 悪性腸腰筋症候群 | 181 |
| 浅い鎮静 | 216 |
| アズノール [®] | 155 |

| | |
|-------------------------|----------------|
| アズレンスルホン酸Na水和物 | 155 |
| アセトアミノフェン | 36, 178 |
| アセリオ [®] 静注液 | 36, 44 |
| アタラックス [®] -P | 163 |
| アドソルビン [®] | 171 |
| アトロピン硫酸塩 | 169 |
| アフアチニブ | 184 |
| アブストラル [®] 舌下錠 | 77, 98, 112 |
| アフタゾロン [®] | 155 |
| アプレピタント | 159 |
| アミティーザ [®] | 164, 166 |
| アミトリプチリン | 118 |
| アモバン [®] | 133 |
| アリピプラゾール | 145 |
| アリムタ [®] | 40 |
| アルギン酸Na | 155 |
| アルダクトン [®] A | 191, 198 |
| アルピニー [®] 坐剤 | 45 |
| アルプラゾラム | 149, 162, 207 |
| アルロイドG | 155 |
| アロキシ [®] | 159 |
| アンヒバ [®] 坐剤 | 45 |
| アンブロキシソール塩酸塩 | 207 |
| アンペック [®] 坐剤 | 64, 77, 86, 98 |

い

| | |
|--------------------------|-------------------|
| イーフェン [®] バッカル錠 | 77, 112 |
| 意識障害 | 55, 138, 213, 302 |
| イソソルビド | 201 |
| イソバイド [®] | 201 |
| 依存 | 149 |
| 依存リスク | 132 |
| 胃粘膜障害 | 40 |

| | |
|-------------------|-----|
| イフェンプロジル | 118 |
| イメンド [®] | 159 |
| 意欲低下 | 150 |
| イレウスチューブ | 173 |
| イレッサ [®] | 184 |
| 咽頭粘膜炎 | 155 |

う

| | |
|----------------------|-----|
| ウインタミン [®] | 146 |
| ヴォトリエント [®] | 184 |
| ウプレチド [®] | 53 |

え

| | |
|---------------------|-----|
| エスシタロプラム | 150 |
| エスゾピクロン | 133 |
| エスタゾラム | 134 |
| エトポシド | 169 |
| エバミール [®] | 134 |
| エビリファイ [®] | 145 |
| エルカトニン | 214 |
| エルシトニン [®] | 214 |
| エルロチニブ | 184 |
| 炎症の強い腫瘍 | 306 |
| 延命処置 | 272 |

お

| | |
|------------------------|---------------------------|
| 嘔気 | 58, 59, 79, 158, 213, 310 |
| 嘔気対策 | 52, 286 |
| 嘔吐 | 158 |
| オキサリプラチン | 118 |
| オキシコドン | 91, 204 |
| オキシコンチン [®] 錠 | 63, 91 |
| オキノーム [®] 散 | 62, 64, 78, 91, 104 |
| オキファスト [®] 注 | 64, 91, 107 |

| | |
|----------------------|---------------|
| オクトレオチド酢酸塩 | 175 |
| オシメリチニブ | 184 |
| オピオイド過量 | 55, 302 |
| オピオイド換算の基本公式 | 70 |
| オピオイド換算表 | 72 |
| オピオイドスイッチング | 70 |
| オピオイド速放製剤 | 178, 181 |
| オピオイドタイトレーション | 66 |
| オピオイド退薬症状 | 56 |
| オピオイド注射剤 | 107 |
| オピオイドに対する誤解 | 253 |
| オピオイドの副作用 | 51, 58 |
| オピオイド無効の呼吸困難 | 304 |
| オブソ [®] 内服液 | 64, 78, 86 |
| オランザピン | 135, 142, 163 |

か

| | |
|--------------------------|----------|
| 介護保険 | 259 |
| 咳嗽 | 59, 79 |
| 過活動型せん妄 | 139 |
| 可逆性せん妄 | 138 |
| 顎骨壊死 | 179 |
| 喀痰貯留 | 304 |
| 下肢筋力低下 | 210 |
| 下肢麻痺 | 312 |
| 下腸間膜動脈神経叢ブロック | 128 |
| 過鎮静 | 318 |
| カディアン [®] カプセル | 86 |
| カディアン [®] スティック | 86 |
| 叶えうる現実的な希望 | 232, 241 |
| 叶え難い非現実的な希望 | 232 |
| ガバペン [®] | 118 |
| ガバペンチン | 118 |

| | |
|----------------------|---------------|
| カペシタピン | 169, 184 |
| カロナール [®] 錠 | 36 |
| 間欠的鎮静 | 216 |
| カンジダ症 | 155 |
| 肝障害 | 36, 44, 59 |
| がん性胸水 | 189 |
| がん性心嚢水 | 194 |
| がん性髄膜炎 | 200 |
| がん性腹水 | 197 |
| がん性リンパ管症 | 206, 304 |
| カンピロバクター腸炎 | 171 |
| カンプト [®] | 168 |
| 漢方薬 | 118, 147, 154 |
| ガンマナイフ | 200 |
| カンレノ酸カリウム | 191 |
| 緩和ケアチーム | 15 |
| 緩和ケアに対する誤解 | 251 |
| 緩和ケアの定義 | 12 |

き

| | |
|---------------------|-------------------|
| ギアチェンジ | 247 |
| キシロカイン [®] | 99, 118, 155, 198 |
| 気道狭窄 | 206, 304 |
| キノロン系抗菌薬 | 170 |
| 希望実現 | 280 |
| 気持ちのつらさ | 148 |
| ギャバロン [®] | 182 |
| 急性嘔吐 | 159 |
| 強オピオイド | 28 |
| 胸水単回穿刺 | 191 |
| 胸膜癒着術 | 190 |
| 去痰薬 | 207 |
| 筋弛緩作用 | 132, 149 |

| | |
|---------------------|-----|
| 筋弛緩薬 | 181 |
| キンダバート [®] | 186 |

<

| | |
|----------------------|----------|
| クアゼパム | 134 |
| クエチアピン | 135, 142 |
| 薬の切れ目の痛み | 78 |
| 苦痛緩和のための鎮静 | 216 |
| 苦痛緩和のための鎮静に関するガイドライン | 216 |
| クモ膜下鎮痛法 | 129 |
| クモ膜下フェノールブロック | 128 |
| クラビット [®] | 170 |
| グリセオール [®] | 201 |
| グリセリン浣腸液 | 53, 167 |
| クロナゼパム | 53 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル | 186 |
| クロベタゾン酪酸エステル | 186 |
| クロライドチャンネルアクチベーター | 166 |
| クロルプロマジン | 146, 219 |

け

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 経管投与 | 44, 63 |
| 経口摂取困難時 | 44, 63, 80, 98, 108, 113, 294 |
| 軽度催吐性抗がん剤 | 160 |
| 傾眠 | 294, 298, 302, 304, 308, 310, 316 |
| ケタミン | 118 |
| ケタラール [®] 静注用 | 99, 118 |
| 血小板凝集機能低下 | 40 |
| ケナログ [®] | 155 |
| ゲフィチニブ | 184 |

| | |
|------------|---------------|
| 下痢 | 166 |
| ケンエーG | 167 |
| 幻覚・妄想抑制効果 | 141 |
| 剣状突起下心膜開窓術 | 194 |
| 倦怠感 | 153, 213, 310 |
| 見当識の低下 | 139 |

こ

| | |
|--------------|-------------------------|
| 高Ca血症 | 213, 310 |
| 抗EGFR抗体薬 | 184 |
| 高PRL血症 | 141 |
| 抗うつ薬 | 118, 135, 150, 314, 320 |
| 口渇感 | 53 |
| 抗がん剤が奏効する腫瘍 | 22 |
| 抗がん剤中止 | 247 |
| 抗がん剤治療開始時のIC | 241 |
| 抗がん剤による嘔気・嘔吐 | 158 |
| 抗がん剤による下痢 | 166 |
| 抗がん剤による皮膚毒性 | 184 |
| 抗がん剤の中止 | 20 |
| 抗がん剤の不確実性 | 241 |
| 口腔粘膜炎 | 153, 155 |
| 口腔用ステロイド軟膏 | 155 |
| 抗けいれん薬 | 118 |
| 抗コリン薬 | 208, 304, 320 |
| 甲状腺機能低下 | 310 |
| 抗精神病薬 | 135, 141, 314, 320 |
| 高度催吐性抗がん剤 | 160 |
| 抗不安作用 | 132 |
| 抗不安薬 | 161, 207 |
| 硬便 | 166 |
| 後方除圧固定術 | 211 |
| 硬膜外鎮痛法 | 129 |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| 硬膜外ブロック | 129 |
| 絞扼性イレウス | 173 |
| 呼吸困難 | 59, 79, 204, 296, 304 |
| 呼吸抑制 | 55, 294, 303, 304 |
| 牛車腎気丸 | 119, 122 |
| 骨転移 | 178, 213, 288, 312 |
| 骨転移合併症 | 178 |
| 骨転移局所への放射線治療 | 179 |
| 骨転移痛 | 300 |
| コデインリン酸塩 | 83 |
| コミュニケーション技術研修会 (CST) | 229 |
| コリン様作用 | 168 |
| コレカルシフェロール | 179 |
| 混合型せん妄 | 139 |
| コンスタン [®] | 149, 162, 207 |
| コントミン [®] | 146, 219 |

さ

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| 最小度催吐性抗がん剤 | 160 |
| 在宅緩和ケア | 259 |
| サイレース [®] | 134, 144, 219 |
| サインバルタ [®] カプセル | 118, 150, 164, 179, 181 |
| ざ瘡様皮疹 | 185 |
| サドルブロック | 128 |
| サリベート [®] エアゾール | 53 |
| 酸化マグネシウム | 51, 166 |
| 酸化マグネシウム錠 | 65, 83, 88, 93, 104 |
| 三叉神経ブロック | 127 |
| サンドスタチン [®] | 170, 175 |

し

| | |
|-------|---------------|
| ジアゼパム | 136, 145, 181 |
|-------|---------------|

- ジェイゾロフト®150
 ジオトリフ®184
 ジクロフェナク Na 坐剤42
 ジスチグミン53
 シスプラチン310
 事前ケアプラン272
 事前指示272
 死前喘鳴208, 305
 持続痛48, 66
 持続的鎮静216
 持続的鎮静に対する誤解261
 持続皮下注（静注）63, 107
 実測 Ca 値213
 ジフェンヒドラミン・ジプロフィリン配合剤163
 ジプレキサ®135, 142, 163
 ジプレキサ® サイデイス® 錠99
 社会保険労務士15
 弱オピオイド28, 81
 芍薬甘草湯119, 122
 十全大補湯155
 終末期の検査・輸液263
 宿便171
 出血187
 腫瘍内科・緩和ケア科兼任医師16
 消化管ステント174
 消化管バイパス術174
 上下腹神経叢ブロック128
 食道粘膜炎155
 食欲不振153, 310
 徐放製剤48, 63
 侵害受容性疼痛33
 神経障害性疼痛
 33, 82, 118, 150, 179, 181, 293
 神経ブロック127, 181, 308
 浸出液187
 腎障害40, 44, 59, 79
 診断時からの緩和ケア19
 浸透圧性下剤166
 浸透圧利尿薬201
 心嚢水単回穿刺195
 心嚢ドレナージ194
 心膜癒着術194
 新レシカルボン®166
- す**
- 錐体外路症状141, 286, 318
 水和物原末86
 スーテント®184
 スコポラミン臭化水素酸塩水和物
208
 スチバーガ®184
 ステロイド124, 154, 175, 179, 181,
 192, 195, 198, 201, 206, 211, 306
 ストーマ造設174
 ストロンチウム-89179
 スニチニブ184
 スピロラクトン191, 198
- せ**
- 静座不能症320
 星状神経節ブロック127
 生存期間中央値14
 制吐薬286, 320
 制吐薬適正使用ガイドライン158
 生理食塩水大量補液214
 脊髄圧迫症候群210, 312
 脊髄神経根ブロック127

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| セツキシマブ | 184 |
| セニラン [®] | 136, 144, 219 |
| セルシン [®] | 181 |
| セルトラリン | 150 |
| セレコックス [®] 錠 | 40 |
| セレネース [®] | 51, 99, 142, 163, 318 |
| ゼローダ [®] | 184 |
| セロクエル [®] | 135, 142 |
| セロクラール [®] | 118 |
| 全人的苦痛 | 12 |
| 蠕動痛 | 174 |
| 全脳照射 | 200 |
| センノシド | 51, 166 |
| せん妄 | 53, 58, 59, 138, 149, 314, 316, 318 |
| せん妄患者の不眠 | 314 |
| せん妄予防効果 | 133 |
| せん妄リスク | 132 |
| 専門的緩和ケア | 20 |

そ

| | |
|-----------------------|--------------------|
| 爪囲炎 | 185 |
| 早期からの緩和ケア | 13 |
| 早発性(コリン作動性)下痢 | 168 |
| 搔痒感 | 53 |
| ソーシャル・ワーカー | 15, 259 |
| 速放製剤 | 48, 62, 76, 78 |
| ソセゴン [®] | 83 |
| ゾピクロン | 133 |
| ゾメタ [®] 点滴静注 | 178, 210, 213, 311 |
| ソラナックス [®] | 149, 162, 207 |
| ソラフェニブ | 184 |
| ソル・メドロール [®] | 206 |

| | |
|---------------------|--------------------|
| ソルダクトン [®] | 191 |
| ゾルピデム | 133 |
| ゾレドロン酸水和物 | 178, 210, 213, 311 |

た

| | |
|---------------------------------|----------|
| ダイアアップ [®] | 136, 145 |
| 退院前カンファレンス | 259 |
| 大建中湯 | 175 |
| 体性痛 | 33 |
| 大腸刺激性下剤 | 166 |
| 体動時痛 | 298, 300 |
| タイトレーション | 50, 70 |
| 代理意志決定人の選定 | 272 |
| タグリッソ [®] | 184 |
| タペンタドール | 103 |
| タムスロシン | 53 |
| タルク | 190 |
| タルセバ [®] | 184 |
| 炭酸水素ナトリウム・無水リン酸 二水素ナトリウム配合坐剤 | 166 |
| 炭酸マグネシウム | 179 |
| 短時間作用型睡眠薬 | 134 |
| ダントリウム [®] | 182 |
| ダントロレンナトリウム水和物 | 182 |
| タンナルビン | 171 |
| タンニン酸アルブミン | 171 |

ち

| | |
|--------------|-----|
| 地域連携 | 15 |
| 遅発性(粘膜傷害性)下痢 | 169 |
| 遅発性嘔吐 | 159 |
| 注意障害 | 138 |
| 中時間作用型睡眠薬 | 134 |

| | |
|------------------|-------------------|
| 中等度催吐性抗がん剤 | 160 |
| 中途覚醒 | 134 |
| 超音波内視鏡下腹腔神経叢ブロック | 308 |
| 腸管蠕動低下 | 166 |
| 長時間作用型睡眠薬 | 134 |
| 超短時間作用型睡眠薬 | 133 |
| 沈降炭酸カルシウム | 179 |
| 鎮痛補助薬 | 30, 118, 179, 181 |

つ

| | |
|--------------|----------|
| 強オピオイド鎮痛薬の選択 | 59 |
| つらさと支障の寒暖計 | 148, 320 |

て

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 手足症候群 | 185 |
| 低 Alb 血症 | 213, 310 |
| 低 Mg 血症 | 310 |
| 低 Na 血症 | 310 |
| 低活動型せん妄 | 139, 151 |
| 定型抗精神病薬 | 141 |
| デカドロン [®] | 124 |
| デキサート [®] | 154, 159, 175, 202, 206 |
| デキサメタゾン | 124, 154, 159, 175, 202, 206, 210 |
| デキサルチン [®] | 155 |
| デジレル [®] | 135, 143 |
| テトラミド [®] | 135, 143 |
| デノスマブ | 178, 210 |
| デノタス [®] | 179 |
| デュロキセチン | 118, 150 |
| デュロキセチン塩酸塩 | 164, 179, 181 |
| デュロテップ [®] MT パッチ | 96 |

| | |
|-------------------------|-------------|
| デルモベート [®] | 186 |
| テレミンソフト [®] 坐薬 | 53, 99, 166 |
| 電解質異常 | 310 |
| 天井効果 | 81 |
| 転倒 | 149 |
| 転倒リスク | 132 |
| 天然型ビタミンD | 179 |
| 天然ケイ酸アルミニウム | 171 |

と

| | |
|-------------------------|--------------------|
| 頭蓋内圧亢進症状 | 201 |
| 透析患者 | 44, 59 |
| ドキシル [®] | 184 |
| 突出痛 | 48, 298 |
| ドパミン受容体 | 163 |
| トボイソメラゼ阻害薬 | 169 |
| トポテシン [®] | 168 |
| ドラール [®] | 134 |
| ドライシロップ製剤 | 44 |
| トラゾドン | 135 |
| ドラッグチャレンジテスト | 120 |
| トラベルミン [®] | 163 |
| トラマール [®] OD 錠 | 81 |
| トラマドール | 81 |
| トラムセット [®] 配合錠 | 84 |
| トリアゾラム | 133 |
| トリプタノール [®] | 118 |
| ドルミカム [®] | 136, 144, 207, 216 |
| ドンペリドン | 52, 162 |

な

| | |
|----------------------|-------------|
| ナイキサン [®] 錠 | 40 |
| 内臓痛 | 33 |
| ナウゼリン [®] | 52, 99, 162 |

ナロキソン……………55, 302

に

ニトラゼパム……………134

入眠困難……………133

認知障害……………138

ね

ネクサバル®……………184

眠気……………53, 58, 59

ネルボン®……………134

の

濃グリセリン・果糖注射液……………201

脳転移……………200

脳浮腫……………201

ノバミン®……………51

ノバミン®錠
……………62, 65, 83, 88, 92, 104, 163

ノバミン®注……………99

ノルスパン®テープ……………83

は

ハイスコ®……………208

排尿障害……………53

背部痛……………210

バクリタキセル……………118

バクロフェン……………182

パシーフ®カプセル……………86

バゾパニブ……………184

パニツムマブ……………184

ハルシオン®……………133

ハルナール®……………53

パロノセトロン塩酸塩……………159

ハロペリドール……………51, 142, 163, 318

半夏瀉心湯……………155, 169

バンコマイシン……………171

パンテノール……………174

パントール®……………174

ひ

ピーガード®錠……………86

非オピオイド……………28

ビオフェルミン®……………170

皮下輸液法……………265

ピコスルファート……………166

ピコスルファートNa……………52

ピサコジル……………53, 166

ヒスタミン受容体……………163

ビソルボン®……………207

非定型抗精神病薬……………141

ヒドロキシジン塩酸塩……………163

皮膚ケア……………187

皮膚腫瘍……………187

皮膚障害……………184

ビペリデン……………320

非ベンゾジアゼピン系睡眠薬……………133

標準治療……………241

ヒルドイド®……………185

ヒルナミン®……………146, 219

ふ

不安……………150

ファンギゾン……………155

フェイススケール……………31

フェノバル®……………219

フェノバルピタール……………136, 145, 219

フェンタニル……………96

フェンタニルROO製剤
 64, 77, 78, 98, 112
 フェンタニル注射液 64, 96, 107
 フェンタニル貼付剤
 27, 64, 71, 77, 96, 98
 フェントス[®] テープ 96
 深い鎮静 216
 不可逆性せん妄 138
 腹腔神経叢ブロック 127, 308
 腹水単回穿刺 197
 腹水濾過濃縮再静注
 (KM-CART) 197
 プスコパン[®] 169, 174, 208
 ブチルスコポラミン臭化物
 169, 174, 208
 不对神経節ブロック 128
 フッ化ピリミジン系抗がん剤 169
 ブプレノルフィン 83
 不眠 132
 フラジール[®] 171
 プリンペラン[®] 120, 162, 174
 ブルゼニド[®] 錠
 51, 63, 83, 88, 93, 104, 166
 フルニトラゼパム 134, 144, 219
 フルルビプロフェン アキセチル 41
 ブレオ[®] 195
 ブレオマイシン 194
 プレガバリン 118, 179, 181, 293
 プレドニゾロン 124
 プレドニン[®] 124
 プレベノン[®] 注 64, 86, 107
 プロイメンド[®] 159
 プロクロルペラジン 51, 163
 フロセミド 191, 198
 プロチゾラム 134

プロドラッグ 40
 プロマゼパム 136, 144, 219
 プロマック[®]D 155
 プロムヘキシム塩酸塩 207
 フロリード 156

へ

閉塞性イレウス 173
 ベクティビックス[®] 184
 ベタナミン[®] 53
 ベタメタゾン 124, 154, 175, 192,
 199, 202, 206, 210
 ヘパリン類似物質 185
 ペメトレキセド 40
 ペモリン 53
 ペロスピロン 145
 ベンザリン[®] 134
 ベンゾジアゼピン系抗不安薬 149
 ベンゾジアゼピン系睡眠薬
 133, 314
 ベンゾジアゼピン系薬剤 144, 318
 ペンタジン[®] 83
 ペンタゾシン 83
 返答に困る質問への対応例 276
 便秘 58, 59, 79, 166
 便秘対策 52, 286

ほ

包括的がん医療モデル 13
 膀胱直腸障害 210
 放射線治療 178, 211
 ホスアプレピタントメグルミン 159
 ホスピスに対する誤解 255
 補正Ca値 213, 310

| | |
|------------------------------------|--------|
| 補中益気湯 | 154 |
| ポラプレジック | 155 |
| ボルタレン [®] サボ [®] | 42, 45 |

ま

| | |
|--------------------|-----|
| マイスリー [®] | 133 |
| マクロライド系抗菌薬 | 171 |
| 麻痺性イレウス | 174 |
| 麻薬拮抗性鎮痛薬 | 83 |

み

| | |
|---------------------|--------------------|
| ミアンセリン | 135 |
| ミオクロオクス | 53 |
| ミダゾラム | 136, 144, 207, 216 |
| 看取り | 282 |
| ミノサイクリン塩酸塩 | 186 |
| ミノマイシン [®] | 186 |
| ミルタザピン | 151 |

む

| | |
|---------------------|-----|
| ムコソルバン [®] | 207 |
| ムコダイン [®] | 207 |

め

| | |
|---------------------|---------------|
| メキシチール | 118 |
| メキシレチン | 118 |
| メサドン | 29 |
| メサペイン [®] | 29 |
| メタストロン [®] | 179 |
| メチルプレドニゾロン | 206 |
| メトクロプラミド | 120, 162, 174 |
| メトロニダゾール | 171, 187 |
| メニレット [®] | 201 |
| メラトニン受容体作動薬 | 133, 143, 314 |

も

| | |
|----------------------|---------|
| モーズペースト | 187 |
| モルヒネ | 86, 204 |
| モルヒネ塩酸塩錠 | 86 |
| モルヒネ塩酸塩注射液 | 64, 86 |
| モルペス [®] 細粒 | 64, 86 |

ゆ

| | |
|--------------------|-------------------------|
| ユーロジン [®] | 134 |
| 輸液の減量 | 175, 191, 198, 205, 304 |
| ユニタルク [®] | 189 |

よ

| | |
|-----------|-----------------------------|
| 腰背部痛 | 312 |
| 抑肝散 | 147 |
| 予後告知 | 266 |
| 予後予測 | 270 |
| 予測が可能な突出痛 | 78 |
| 予測困難な突出痛 | 78, 115 |
| 予防的レスキュー | 78, 115, 178, 181, 298, 300 |

ら

| | |
|-------------------------|------------|
| ラキソベロン [®] | 166 |
| ラキソベロン [®] 内用液 | 52, 65, 99 |
| ラシックス [®] | 191, 198 |
| ラビッドタイトレーション | 63, 107 |
| ラメルテオン | 133 |
| ランドセン [®] | 53 |
| ランマーク [®] | 178, 210 |

り

| | |
|---------------------|-----|
| リオレサル [®] | 182 |
| リスパダール [®] | 142 |

- リスペリドン 142
 リスミー® 134
 六君子湯 154
 リドカイン 118, 155
 利尿薬 191, 199
 リビングウィル 272
 リフレックス® 151
 リポソーマルドキソルピシン 184
 リボトリール® 53
 リリカ® 118, 179, 181, 293
 リルマザホン 134
 リン酸二カリウム・無機塩類配合剤
 53
 リンデロン®
 ...99, 124, 154, 175, 192, 199, 202,
 206
 リントン® 142
- る**
- ルーラン® 145
 ルネスタ® 133
 ルビプロストン 164, 166
- れ**
- レクサプロ® 150
 レゴラフェニブ 184
 レスキュー 48, 75, 292
 レスキュー至適量 290
 レスキュー製剤の効果発現の速さ
 75
 レスキュー製剤の至適量 76
- レスキュー製剤の不応期 76
 レスリン® 135, 143
 レペタン® 83
 レボトミン® 146
 レボフロキサシン 170
 レボメプロマジン 146, 219
 レメロン® 151
 レンドルミン® 134
 レンバチニブ 184
 レンビマ® 184
- ろ**
- ロキソニン®錠 40
 ロキソプロフェンNa内服液 45
 ロゼックス® 187
 ロゼレム® 133, 143
 肋間神経ブロック 127
 ロピオン® 静注 41, 45
 ロヒプノール® 134, 144, 219
 ロペミン® 170
 ロペラミド塩酸塩 170
 ロラゼパム 149, 161, 207
 ロラメット® 134
 ロルメタゼパム 134
- わ**
- ワイパックス® 149, 161, 207
 ワコビタール® 136, 145, 219
 腕神経叢ブロック 127
 ワントラム®錠 81