

索引

欧文

GABA 受容体	39, 163
NaSSA (noradrenergic and specific serotonergic antidepressant)	37
NMDA 受容体	163
QTc 時間延長	48
SNRI (serotonin noradrenaline reuptake inhibitor)	37
SSRI (selective serotonin reuptake inhibitor)	37
TALK の原則	30, 31

和文

あ

アキネトン [®]	56
悪性緊張病	87, 95
悪性症候群	87, 91, 101
悪性症候群の診断基準	93
アセナピン	53
アドレナリン	51
アネキセート [®]	56
アルコール依存症	162
アルコール離脱症候群	162
アルコール離脱せん妄	162
アルツハイマー型認知症	28
意識混濁	69, 70
意識障害	68, 70, 79, 85, 92, 145
意識清明	70

意識変容	70
医療保護入院	64
うつ状態	44
うつ病	20, 26, 114
うつ病性昏迷	82
液剤	46
オランザピン	52
オレキシン	41
オレキシン受容体拮抗薬	41

か

解離	141
解離状態	138
解離性健忘	141
解離性昏迷	79, 80, 81
過活動型せん妄	152, 157
過換気症候群	74
カタトニア	84
カタルシス	132
カタレプシー	86
過量服薬	109, 138
キーパーソン	133
奇異反応	57
希死念慮	30, 125, 128, 130
基礎律動	71
気分安定薬	32, 44
気分障害	114
拒絶型	88
緊急措置入院	64

筋強剛	87, 92
緊張病	81, 84
緊張病性昏迷	81
緊張病性障害	84
緊張病のサブタイプ	88
ケースマネジメント	133
ケースワーカー	134
血球減少	45
見当識障害	71
高CK血症	92
抗うつ薬	32, 37, 159
抗菌薬	106
口腔内崩壊錠	46
攻撃性	24
抗精神病薬	32, 48, 60, 104, 155
向精神薬	32, 46, 91
向精神薬中毒	109
高体温	92
抗パーキンソン病薬	56, 97
抗不安薬	32, 42
興奮	24, 26
興奮型	88
高齢者	106
骨折	106
コリン作動性離脱症候群	105
混合型せん妄	145, 152
昏睡	70
昏迷	79, 85
昏迷の類型	81

さ

再企図	130
三環系抗うつ薬	37, 109
ジアゼパム	54, 76, 87
ジエスカレーション	24, 157
シクレスト® 舌下錠	53
自殺	122
自殺企図	26, 121, 125, 126
自殺再企図のリスク評価	130
自殺者数	123
自殺念慮	125, 130
自殺の危険因子	131
自殺未遂	30
自傷	30, 138
自傷患者	121
自傷他害	64
自責的	26
自損行為	123, 126
ジプレキサ®	52
ジプレキサ® ザイディス®	52
準備因子	153
昇圧薬	111
焦燥	25
自律神経症状	92
身体症状	67
診療報酬	134
錐体外路症状	33, 34, 92
睡眠覚醒リズム障害	146
睡眠薬	32, 39, 158
スボレキサント	158
正常脳波	72

精神科患者	19
精神科診察	24
精神科病床	63
精神疾患	20
精神症状	68, 143
精神保健福祉士	135
舌下錠	46
セルシン®	54
セレネース®	48
セロトニン活性	100
セロトニン作動薬	100
セロトニン症候群	95, 99, 104
セロトニン・ドーパミン受容体拮抗薬	50
選択的セロトニン再取り込み阻害薬 (SSRI)	37
選択的セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬 (SNRI)	37
せん妄	70, 143
せん妄症状	148
せん妄の診断	144, 146
せん妄の治療	153
せん妄の病型	152
せん妄の予防	153
双極性障害	44, 114
躁状態	44
促進因子	153
措置入院	64

た

第1世代抗精神病薬	34
第2世代抗精神病薬	34
多剤処方	43

脱エスカラーション	24
炭酸水素ナトリウム	111
炭酸リチウム	104, 114
ダントロレン	97
致死性緊張病	87
注意障害	146
長期処方	44
直接因子	153
鎮静薬	50
低活動型せん妄	152, 160
定型抗精神病薬	34, 155
デクスメドミジン	159, 165
転院	63
転科	63
転床	63
転倒	106
等価換算	60
ドーパミンD ₂ 受容体	32
ドーパミン過感受性精神病	105
突発性異常波	72
ドルミカム®	55

な

入院対応	63
任意入院	64
認知機能障害	28
認知症	20, 28, 149
脳波	71, 79
ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ薬 (NaSSA)	37

は

バルビツール酸系薬	112
ハロペリドール	48
悲観的	26
非けいれん性てんかん重積	73
ヒステリー性昏迷	81
非ステロイド性抗炎症薬	106
非定型抗精神病薬	34, 155
ヒドロキシジン	76
ビペリデン	56
非ベンゾジアゼピン系薬	40
副作用	36, 91
不定愁訴	29
不眠	29, 42
フルマゼニル	56, 118
プロポフォール	165
ペーパーバッグ	77
ベゲタミン	113
ベンゾジアゼピン系薬	39, 82, 155, 164
ベンゾジアゼピン受容体拮抗薬	56
ベンゾジアゼピン受容体作動薬	32, 39, 104, 118
ホリゾン [®]	54

ま

慢性リチウム中毒	116
ミダゾラム	55
メラトニン	41
メラトニン受容体作動薬	41
妄想	22, 26
もうろう	70
持ち越し効果	48

や

夜間せん妄	145
薬物中毒	109
四環系抗うつ薬	37

ら・わ

ラメルテオン	158
力価	60
リスパダール [®]	50
リスペリドン	50
離脱症候群	104
離脱症状	104
リバウンド精神病	105
流涎	36
臨床心理士	135
ワルファリン	106