

欧文		和文	
AC	70		
AUC	176		
Cancer Board	30		
CYP	176		
CYP2B6	76		
CYP2D6	76		
CYP2E1	65		
CYP3A	76		
end-of-dose failure	110, 169		
H ₂ 受容体拮抗薬	179		
IVR	36		
MS コンチン [®]	87		
MS ツワイスロン [®]	87		
NRS	12, 72		
NSAIDs	57, 177, 193		
numerical rating scale	12		
OIH	207		
PPI	177, 179		
pseudo-addiction	216		
P 糖蛋白	176		
QT 延長	180		
SINS	31		
TCA	160		
TKI	178		
WHO 方式がん疼痛治療法	51		
		【あ】	
		アセスメント	15
		アセチルシステイン	70
		アセトアミノフェン	65, 193
		アセリオ [®]	65
		アゾール系抗真菌薬	179
		アブストラル [®]	94
		アブレーション療法	38
		アミトリプチリン	160, 174, 182
		アロディニア	44, 172, 207
		アンヒバ [®]	65
		アンベック [®]	87
		イーフェン [®]	94
		胃酸分泌抑制薬	177
		痛みとは	40
		痛みの原因	40
		痛みの持続性	11
		痛みの性質	11
		痛みの増強	203
		痛みの強さ	12
		痛みの破局的思考	49
		痛みの評価	191
		痛みの部位	225, 226
		痛みのマネジメント	15
		胃腸障害	61
		溢流性便秘	129
		イブプロフェン	58
		エトドラク	58
		嚥下機能	223
		嚥下障害	223
		エンザルタミド	179
		嘔気	132
		オキシコドン	91, 179
		オキシコンチン [®]	91
		オキノーム [®]	91
		オキファスト [®]	91
		悪心嘔吐	196
		オピオイド	71, 194
		オピオイド・クライシス	41
		オピオイド使用障害	219, 225
		オピオイドスイッチ (ング)	119, 123, 131, 136, 140, 144, 149, 199
		オピオイドの換算表	124
		オピオイドの切り替え	125
		オピオイドの減量	111
		オピオイドの増量	109
		オピオイド不適切使用	218
		オピオイド誘発性便秘	128
		オプソ [®]	87
		オンコロジー・エマージェンシー	44
		【か】	
		画像所見	13
		ガバペン [®]	155
		ガバベンチノイド	155
		ガバペンチン	155
		かゆみ	146
		カルバマゼピン	158, 182
		カロナル [®]	65
		肝機能障害	74, 120
		肝毒性	66

管理方法	116	3段階除痛ラダー	53, 54	【た】	
偽性嗜癖	216	ジクロフェナク	58	耐性	207
急性痛	46	シスプラチン	177	耐性形成	119
局所麻酔薬	19	持続痛の増悪	205	体性痛	42
くも膜下鎮痛法	23	嗜癖	75, 218	タイトレーション	169
クロナゼパム	174	出血傾向	62	退薬症候	112
ケア	15	消化管閉塞	77, 197	タキサン系	173
経皮的椎体形成術	36	消化性潰瘍	61	ダコミチニブ	182
外科的治療	30	小児	191	タベンタ [®]	101
血小板機能抑制	62	除痛ラダー	71	タベンタドール	101
ケミカルコーピング		徐放性	78	タモキシフェン	181
	110, 218, 225	侵害受容性疼痛	43	タリージェ [®]	155
抗うつ薬	160	腎機能障害		腸閉塞	129
効果の確認	217		62, 74, 120, 185	治療目標	51
高カルシウム血症	197	神経障害性疼痛		鎮痛薬使用の5原則	53
抗痙攣薬	155		42, 43, 172	椎体骨転移	36
交叉耐性	119	神経破壊の処置	19	痛覚過敏	44, 172, 207
高周波熱凝固	173	神経ブロック	19, 173	デカドロン [®]	165
硬膜外鎮痛法	23	心血管障害	63	デキサート [®]	165
高齢者	74	ステロイド	165	デキサメタゾン	165
コカール [®]	65	制吐薬	134	テグレートール [®]	158
誤解	209	脊髄麻痺	31	デュロキシセチン	
誤解に対する説明	115	脊椎骨転移	31		162, 174, 181, 182
呼吸困難	77, 120	セレコキシブ	58	透析患者	184
骨転移	30, 36	セレコックス [®]	58	透析性	186
コティン	84	セロトニン症候群	163	疼痛管理	114
子ども	191	先入観	209	動脈塞栓術	38
【さ】		せん妄	138, 141	投与経路	
剤形	77	相互作用	63		78, 136, 140, 144
再照射	28	掻痒	146	突出痛	168
サインバルタ [®]	162	速放性	78	トラマール [®]	81
三環系抗うつ薬	160			トラマドール	81
				トリプタノール [®]	160

【な】	
ナイキサン [®]	58
内臓神経ブロック	21
内臓痛	42
ナブメトン	58
ナプロキセン	58
ナルサス [®]	98
ナルラピド [®]	98
認知機能障害	
75, 82, 85, 89, 92, 96,	105
脳腫瘍	197
脳転移	27
飲み忘れ	224
ノリトレン [®]	160
ノルスパン [®]	104
ノルトリプチリン	160

【は】	
ハイベン [®]	58
パシーフ [®]	87
パロキセチン	181
非オピオイド鎮痛薬の 用法用量	72
非がん性慢性疼痛	49
ヒドロモルフォン	98
フェンタニル	94, 179, 199
フェンタニル口腔粘膜 吸収製剤	171
フェンタニル持続皮下注	127
フェンタニル貼付剤	126, 127
フェントス [®]	94
腹腔神経叢ブロック	21

副作用	116
副作用の懸念	210
服薬指導	113
不適切使用	75
ブプレノルフィン	104
ブルフェン [®]	58
フルルビプロフェン	58
プレガバリン	155, 174
プレペノン [®]	87
ベタメタゾン	165
便秘	128
放射線障害	28
放射線治療	25
ポルタレン [®]	58

【ま・や】	
末期腎不全患者	185
末梢神経圧迫症状	27
慢性痛	46, 225
ミロガバリン	155
メサドン	106, 126, 175, 180
メサペイン [®]	106
メトトレキサート	177
メロキシカム	58
モービック [®]	58
モルヒネ	87
モルベス [®]	87
薬物相互作用	75, 121, 176
有痛性骨転移	27

【ら・わ】	
リスバダール [®]	84
リリカ [®]	155
リンデロン [®]	165
レスキュー薬	169
レペタン [®]	104
レリフェン [®]	58
ロキソニン [®]	58
ロキソプロフェン	58
ロピオン [®]	58
ワントラム [®]	81