

正誤表・更新情報

本書中に訂正・更新箇所等がございました。お手数をお掛けしますが、下記ご参照頂けますようお願い申し上げます（2018年11月6日）

■第1版 第1刷（2015年10月20日発行）の修正・更新箇所

頁	場所	修正前	修正後	補足	掲載
第1章 TIVAを行うために必要な知識 (2) TCIポンプと輸液回路 Q7. TCIポンプがない場合、TIVAはできないのでしょうか？					
28	図のキャプション1文目(1~2行目)	プロポフォール1 mg/kgのボース投与に続き、10 mg/kg/分(10分)→8 mg/kg/分(10分)→6 mg/kg/分の持続投与を行う薬物動態シミュレーション。	プロポフォール1 mg/kgのボース投与に続き、10 mg/kg/ 時 (10分)→8 mg/kg/ 時 (10分)→6 mg/kg/ 時 の持続投与を行う薬物動態シミュレーション。		15/11/17
第2章 TIVAによる麻酔管理					
66	本文下から6,7行目	心拍出量が低下するとプロポフォールの血中濃度が 低下 する	心拍出量が低下するとプロポフォールの血中濃度が 上昇 する		18/10/05
101	本文上から7行目	モニターなどを装着して、鎮 痛 度を適正に	モニターなどを装着して、鎮 静 度を適正に		18/11/06
第3章 さまざまな患者、病態に対するTIVA					
141	本文上から2,3行目	BMIが $\geq 25\text{kg}/\text{m}^2$ 以上の患者に対して BMI $22\text{kg}/\text{m}^2$に補正した理想 体重に基づいた	BMIが $\geq 25\text{kg}/\text{m}^2$ 以上の患者に対しては 標準 体重に基づいた		18/10/05
141	Point 2文目	BMI $25\text{kg}/\text{m}^2$ 以上の肥満ではBMI $22\text{kg}/\text{m}^2$ に補正した理想体重	BMI $25\text{kg}/\text{m}^2$ 以上の肥満では 標準体重 またはBMI $22\text{kg}/\text{m}^2$ に補正した理想体重	「標準体重または」を追加	18/10/05
第4章 TIVAをもっと知る (1) 薬物動態・薬力学とモデル Q81 コンパートメントモデルとは何を表すもののでしょうか？					
172	図5	k_{12} , k_{21} の矢印の向きが逆。		※1参照	15/10/29

図表

※1

正

