

正誤表・更新情報

本書中に訂正・更新箇所等がございました。お手数をお掛けしますが、下記ご参照頂けますようお願い申し上げます（2019年4月12日）

■第1版 第1刷（2019年4月10日発行）の修正・更新箇所

頁	場所	修正前	修正後	補足	掲載
第1章 2. 絶対に見逃してはならない波形～急性虚血編					
23	「4 右冠動脈の閉塞」内, 2行目	II誘導の領域が主に障害されるため、下壁誘導のなかでもII誘導で最もST上昇が顕著になる。一方で、左回旋枝が下壁を誘導している場合、III誘導領域も障害されているため、II誘導とIII誘導のST上昇は同程度もしくはIII誘導が有意となる。	III誘導の領域が主に障害されるため、下壁誘導のなかでもIII誘導で最もST上昇が顕著になる。一方で、左回旋枝が下壁を栄養している場合、II誘導領域も障害されているため、II誘導とIII誘導のST上昇は同程度もしくはII誘導が有意となる。		19/04/12
24	「症例3」内, 2行目	II誘導有意のST上昇(図4A▼)であり左回旋枝病変が疑われた。	II誘導有意もしくはII誘導とIII誘導が同程度のST上昇である。またV ₁ ～V ₄ で鏡面像としてのST低下を認め(図4A▼)であり左回旋枝病変が疑われた。		19/04/12