

## 正誤表

本書中に訂正箇所等がございました。訂正し、お詫び致します。お手数をお掛けしますが、訂正箇所を書き込んでお使いいただきますよう、お願い申し上げます。  
(2011年3月22日作成 2012年5月11日更新)

### <本正誤表掲載情報>

[P1] 第3刷(2012年2月24日発行発行)をおもちの方が必要な修正箇所

[P2~3] 第2刷(2011年3月25日発行発行)をおもちの方が必要な修正箇所

[P4~5] 第1刷(2010年10月15日発行発行)をおもちの方が必要な修正箇所

### ■ 第3刷(2012年2月24日発行)をおもちの方が必要な修正箇所

頁	場所	誤	正	補足	掲載
第1章 抗がん剤の副作用症状と治療					
86	アムルピシン 腎不全時の投与量	短銃	胆汁		12/05/11

## ■第2刷(2011年3月25日発行)をおもちの方が必要な修正箇所

頁	場所	誤	正	補足	掲載
第1章 抗がん剤の副作用症状と治療					
86	アムルピシン 腎不全時の投与量	短銃	胆汁		12/05/11
89	表8 脚注	院内死亡率に関するOdds ratio AKIN:3.59	削除	脚注をすべて削除	12/03/01
121	表1 脚注		※2, ※3 削除	脚注を削除	12/03/01
第3章 抗がん剤の種類					
224	イリノテカン【併用注意】箇条書き 2つ目	末梢性筋弛緩剤	↓末梢性筋弛緩剤		12/03/01
224	イリノテカン【併用注意】箇条書き 5つ目	ソラフェニブ	▲ソラフェニブ		12/03/01
231	エキセメスタン【作用機序・体内 動態】箇条書き1つ目	…ステロイド性アロマトーゼ阻害薬	…(ステロイド性アロマトーゼ阻害薬)	()でくる	12/03/01
234	サリドマイド【重大な副作用】2行 目	血性心疾患, 重篤な皮膚 <b>症状</b>	虚血性心疾患, 重篤な皮膚 <b>障害</b>		12/03/01
234	サリドマイド【併用注意】6行目	▲アルコール, 抗うつ薬	▲アルコール, ▲抗うつ薬		12/03/01
239	ベバシズマブ【重大な副作用】2 行目	好中球減少症	骨髓抑制		12/03/01
242	イマチニブメシル酸塩【併用注 意】箇条書き3つ目	↑アセトアミノフェン(肝毒性の増強), ↑グレープフルーツ	▲アセトアミノフェン(肝毒性の増強) ↑グレープフルーツジュース		12/03/01
244	スニチニブ【併用注意】2~5行目	↑CYP3A4阻害薬 ・▲アゾール系抗真菌薬 ・▲マクロライド系抗生物質 ・▲HIVプロテアーゼ阻害薬 ・▲グレープフルーツジュース ↑CYP3A4阻害薬	↑CYP3A4阻害薬 ・アゾール系抗真菌薬 ・マクロライド系抗生物質 ・HIVプロテアーゼ阻害薬 ↑グレープフルーツジュース	記号を修正	12/03/01
244	スニチニブ【併用注意】箇条書き 3つ目	QT間隔延長を起こすことが知られている薬剤(イミプラミン, ピモジドなど), 抗不整脈薬(キニジン, プロカインアミド, ジソピラミド, ソタロールなど)(QT間隔延長, 心室性不整脈などの重篤な副作用のおそれ)	▲QT間隔延長を起こすことが知られている薬剤(イミプラミン, ピモジドなど), ▲抗不整脈薬(キニジン, プロカインアミド, ジソピラミド, ソタロールなど):QT間隔延長, 心室性不整脈などの重篤な副作用のおそれ		12/03/01
245	下から1行目	食事の影響を避けるため, 食事の1時間前から…	高脂肪食摂取時には, 食事の1時間前から…		12/03/01
251	エベロリムス【重大な副作用】5行 目	肺胞 <b>タンパク</b>	肺胞 <b>たんぱく</b> 症		12/03/01

第4章 標準治療における副作用対策

268	【5-FU+I-LV療法】	<table border="1"> <thead> <tr> <th>レジメンと副作用</th> <th>1</th><th>8</th><th>15</th><th>22</th><th>29</th><th>36</th><th>42</th> <th>日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5-FU (500mg/m<sup>2</sup>)</td> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I-LV (250mg/m<sup>2</sup>)</td> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>嘔気・嘔吐</td> <td colspan="7"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>食欲不振</td> <td colspan="7"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>下痢</td> <td colspan="7"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>好中球減少</td> <td colspan="7"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>口内炎</td> <td colspan="7"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>色素沈着</td> <td colspan="7"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>手足症候群</td> <td colspan="7"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>肝機能障害</td> <td colspan="7"></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	レジメンと副作用	1	8	15	22	29	36	42	日	5-FU (500mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓	↓	↓	↓			I-LV (250mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓	↓	↓	↓			嘔気・嘔吐									食欲不振									下痢									好中球減少									口内炎									色素沈着									手足症候群									肝機能障害									<table border="1"> <thead> <tr> <th>レジメンと副作用</th> <th>1</th><th>8</th><th>15</th><th>22</th><th>29</th><th>36</th><th>43</th><th>50</th><th>56</th> <th>日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5-FU (500mg/m<sup>2</sup>)</td> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td></td><td></td><td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I-LV (250mg/m<sup>2</sup>)</td> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td></td><td></td><td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>嘔気・嘔吐</td> <td colspan="9"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>食欲不振</td> <td colspan="9"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>下痢</td> <td colspan="9"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>好中球減少</td> <td colspan="9"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>口内炎</td> <td colspan="9"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>色素沈着</td> <td colspan="9"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>手足症候群</td> <td colspan="9"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>肝機能障害</td> <td colspan="9"></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	レジメンと副作用	1	8	15	22	29	36	43	50	56	日	5-FU (500mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓	↓	↓	↓					I-LV (250mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓	↓	↓	↓					嘔気・嘔吐											食欲不振											下痢											好中球減少											口内炎											色素沈着											手足症候群											肝機能障害												11/03/22																																	
		レジメンと副作用	1	8	15	22	29	36	42	日																																																																																																																																																																																																																																																								
5-FU (500mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																																												
I-LV (250mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																																												
嘔気・嘔吐																																																																																																																																																																																																																																																																		
食欲不振																																																																																																																																																																																																																																																																		
下痢																																																																																																																																																																																																																																																																		
好中球減少																																																																																																																																																																																																																																																																		
口内炎																																																																																																																																																																																																																																																																		
色素沈着																																																																																																																																																																																																																																																																		
手足症候群																																																																																																																																																																																																																																																																		
肝機能障害																																																																																																																																																																																																																																																																		
レジメンと副作用	1	8	15	22	29	36	43	50	56	日																																																																																																																																																																																																																																																								
5-FU (500mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																																												
I-LV (250mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																																												
嘔気・嘔吐																																																																																																																																																																																																																																																																		
食欲不振																																																																																																																																																																																																																																																																		
下痢																																																																																																																																																																																																																																																																		
好中球減少																																																																																																																																																																																																																																																																		
口内炎																																																																																																																																																																																																																																																																		
色素沈着																																																																																																																																																																																																																																																																		
手足症候群																																																																																																																																																																																																																																																																		
肝機能障害																																																																																																																																																																																																																																																																		
268	【UFT+LV療法】	<table border="1"> <thead> <tr> <th>レジメンと副作用</th> <th>1</th><th>8</th><th>15</th><th>22</th><th>29</th><th>36</th><th>43</th><th>50</th><th>56</th> <th>日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UFT (300mg/m<sup>2</sup>)</td> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td></td><td></td><td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LV (75mg/m<sup>2</sup>)</td> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td></td><td></td><td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>嘔気・嘔吐</td> <td colspan="9"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>食欲不振</td> <td colspan="9"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>下痢</td> <td colspan="9"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>好中球減少</td> <td colspan="9"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>口内炎</td> <td colspan="9"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>色素沈着</td> <td colspan="9"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>手足症候群</td> <td colspan="9"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>肝機能障害</td> <td colspan="9"></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	レジメンと副作用	1	8	15	22	29	36	43	50	56	日	UFT (300mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓	↓	↓	↓					LV (75mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓	↓	↓	↓					嘔気・嘔吐											食欲不振											下痢											好中球減少											口内炎											色素沈着											手足症候群											肝機能障害											<table border="1"> <thead> <tr> <th>レジメンと副作用</th> <th>1</th><th>7</th><th>8</th><th>14</th><th>15</th><th>21</th><th>22</th><th>28</th><th>29</th><th>35</th> <th>日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UFT (300mg/m<sup>2</sup>)</td> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LV (75mg/m<sup>2</sup>)</td> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>嘔気・嘔吐</td> <td colspan="10"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>食欲不振</td> <td colspan="10"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>下痢</td> <td colspan="10"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>好中球減少</td> <td colspan="10"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>口内炎</td> <td colspan="10"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>色素沈着</td> <td colspan="10"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>手足症候群</td> <td colspan="10"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>肝機能障害</td> <td colspan="10"></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	レジメンと副作用	1	7	8	14	15	21	22	28	29	35	日	UFT (300mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		LV (75mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		嘔気・嘔吐												食欲不振												下痢												好中球減少												口内炎												色素沈着												手足症候群												肝機能障害													11/03/22
		レジメンと副作用	1	8	15	22	29	36	43	50	56	日																																																																																																																																																																																																																																																						
UFT (300mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																																												
LV (75mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																																												
嘔気・嘔吐																																																																																																																																																																																																																																																																		
食欲不振																																																																																																																																																																																																																																																																		
下痢																																																																																																																																																																																																																																																																		
好中球減少																																																																																																																																																																																																																																																																		
口内炎																																																																																																																																																																																																																																																																		
色素沈着																																																																																																																																																																																																																																																																		
手足症候群																																																																																																																																																																																																																																																																		
肝機能障害																																																																																																																																																																																																																																																																		
レジメンと副作用	1	7	8	14	15	21	22	28	29	35	日																																																																																																																																																																																																																																																							
UFT (300mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																																								
LV (75mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																																								
嘔気・嘔吐																																																																																																																																																																																																																																																																		
食欲不振																																																																																																																																																																																																																																																																		
下痢																																																																																																																																																																																																																																																																		
好中球減少																																																																																																																																																																																																																																																																		
口内炎																																																																																																																																																																																																																																																																		
色素沈着																																																																																																																																																																																																																																																																		
手足症候群																																																																																																																																																																																																																																																																		
肝機能障害																																																																																																																																																																																																																																																																		

第5章 抗がん剤投与手技の基本と注意

309	上から2行目	クレーブオンコロジーシステム	ケモクレーブシステム		12/03/01
-----	--------	----------------	------------	--	----------

## ■第1刷(2010年10月15日発行)をおもちの方が必要な修正箇所

頁	場所	誤	正	補足	掲載
第1章 抗がん剤の副作用症状と治療					
59	下から1行目	2mg/ <b>m2</b> を超える投与は行わない	2mg/ <b>body</b> を超える投与は行わない	赤字部分を修正	11/03/22
86	アムルピシン 腎不全時の投与量	短銃	<b>胆汁</b>		12/05/11
89	表8 脚注	院内死亡率に関するOdds ratio AKIN:3.59	<b>削除</b>	脚注をすべて削除	12/03/01
121	表1 脚注		<b>※2, ※3 削除</b>	脚注を削除	12/03/01
168	表1 脚注	メトレキサートは悪性リンパ腫の原因になることが <b>あり, 稀に浸潤することがある</b>	メトレキサートは悪性リンパ腫の原因になることがある	赤字部分を削除	11/03/22
第3章 抗がん剤の種類					
6 200 205 211 216 226 231 235	第3章の執筆者		すべて「 <b>宮澤真帆, 横山礼子</b> 」と連名に		11/03/22
224	イリノテカン【併用注意】箇条書き2つ目	末梢性筋弛緩剤	<b>↓末梢性筋弛緩剤</b>		
224	イリノテカン【併用注意】箇条書き5つ目	ソラフェニブ	<b>▲ソラフェニブ</b>		
231	エキセメスタン【作用機序・体内動態】箇条書き1つ目	…ステロイド性アロマトラーゼ阻害薬	…(ステロイド性アロマトラーゼ阻害薬)	( )でくる	12/03/01
234	サリドマイド【重大な副作用】2行目	血性心疾患, 重篤な皮膚 <b>症状</b>	<b>虚血性心疾患, 重篤な皮膚障害</b>		12/03/01
234	サリドマイド【併用注意】6行目	<b>▲アルコール, 抗うつ薬</b>	<b>▲アルコール, ▲抗うつ薬</b>		12/03/01
239	ベバシズマブの【適応】		, 以降を改行		11/03/22
239	ベバシズマブ【重大な副作用】2行目	<b>好中球減少症</b>	<b>骨髓抑制</b>		12/03/01
242	イマチニブメシル酸塩【併用注意】箇条書き3つ目	<b>↑アセトアミノフェン(肝毒性の増強), ↑グレープフルーツ</b>	<b>▲アセトアミノフェン(肝毒性の増強) ↑グレープフルーツジュース</b>		12/03/01
243	スニチニブの【適応】		, 以降を改行		11/03/22
244	ソラフェニブの【適応】		, 以降を改行		11/03/22
244	スニチニブ【併用注意】2~5行目	↑CYP3A4阻害薬 ・▲アゾール系抗真菌薬 ・▲マクロライド系抗生物質 ・▲HIVプロテアーゼ阻害薬 ・▲グレープフルーツジュース ↑CYP3A4阻害薬	↑CYP3A4阻害薬 ・アゾール系抗真菌薬 ・マクロライド系抗生物質 ・HIVプロテアーゼ阻害薬 ↑グレープフルーツジュース	記号を修正	12/03/01

244	スニチニブ【併用注意】簡条書き3つ目	QT間隔延長を起こすことが知られている薬剤(イミプラミン、ピモジドなど)、抗不整脈薬(キニジン、プロカインアミド、ジソピラミド、ソタロールなど)(QT間隔延長、心室性不整脈などの重篤な副作用のおそれ)	▲QT間隔延長を起こすことが知られている薬剤(イミプラミン、ピモジドなど)、▲抗不整脈薬(キニジン、プロカインアミド、ジソピラミド、ソタロールなど):QT間隔延長、心室性不整脈などの重篤な副作用のおそれ		12/03/01
245	下から1行目	食事の影響を避けるため食事の1時間前から…	高脂肪食摂取時には、食事の1時間前から…		12/03/01
251	エベロリムス【重大な副作用】5行目	肺胞タンパク	肺胞たんぱく症		12/03/01
252	【注意点】簡条書きの3つ目	空腹時時投与を行う	空腹時投与を行う	赤字部分を削除	11/03/22

第4章 標準治療における副作用対策

268	【5-FU+I-LV療法】	<table border="1"> <thead> <tr> <th>レジメンと副作用</th> <th>1</th><th>8</th><th>15</th><th>22</th><th>29</th><th>36</th><th>42</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5-FU (500mg/m<sup>2</sup>)</td> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td></td> </tr> <tr> <td>I-LV (250mg/m<sup>2</sup>)</td> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td></td> </tr> <tr> <td>嘔気・嘔吐</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>食欲不振</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>下痢</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>好中球減少</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>口内炎</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>色素沈着</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>手足症候群</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>肝機能障害</td> <td colspan="7"></td> </tr> </tbody> </table>	レジメンと副作用	1	8	15	22	29	36	42	5-FU (500mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓	↓	↓	↓		I-LV (250mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓	↓	↓	↓		嘔気・嘔吐								食欲不振								下痢								好中球減少								口内炎								色素沈着								手足症候群								肝機能障害								<table border="1"> <thead> <tr> <th>レジメンと副作用</th> <th>1</th><th>8</th><th>15</th><th>22</th><th>29</th><th>36</th><th>43</th><th>50</th><th>56</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5-FU (500mg/m<sup>2</sup>)</td> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>I-LV (250mg/m<sup>2</sup>)</td> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>嘔気・嘔吐</td> <td colspan="9"></td> </tr> <tr> <td>食欲不振</td> <td colspan="9"></td> </tr> <tr> <td>下痢</td> <td colspan="9"></td> </tr> <tr> <td>好中球減少</td> <td colspan="9"></td> </tr> <tr> <td>口内炎</td> <td colspan="9"></td> </tr> <tr> <td>色素沈着</td> <td colspan="9"></td> </tr> <tr> <td>手足症候群</td> <td colspan="9"></td> </tr> <tr> <td>肝機能障害</td> <td colspan="9"></td> </tr> </tbody> </table>	レジメンと副作用	1	8	15	22	29	36	43	50	56	5-FU (500mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓	↓	↓	↓				I-LV (250mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓	↓	↓	↓				嘔気・嘔吐										食欲不振										下痢										好中球減少										口内炎										色素沈着										手足症候群										肝機能障害											11/03/22																																	
レジメンと副作用	1	8	15	22	29	36	42																																																																																																																																																																																																																																					
5-FU (500mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																						
I-LV (250mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																						
嘔気・嘔吐																																																																																																																																																																																																																																												
食欲不振																																																																																																																																																																																																																																												
下痢																																																																																																																																																																																																																																												
好中球減少																																																																																																																																																																																																																																												
口内炎																																																																																																																																																																																																																																												
色素沈着																																																																																																																																																																																																																																												
手足症候群																																																																																																																																																																																																																																												
肝機能障害																																																																																																																																																																																																																																												
レジメンと副作用	1	8	15	22	29	36	43	50	56																																																																																																																																																																																																																																			
5-FU (500mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																						
I-LV (250mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																						
嘔気・嘔吐																																																																																																																																																																																																																																												
食欲不振																																																																																																																																																																																																																																												
下痢																																																																																																																																																																																																																																												
好中球減少																																																																																																																																																																																																																																												
口内炎																																																																																																																																																																																																																																												
色素沈着																																																																																																																																																																																																																																												
手足症候群																																																																																																																																																																																																																																												
肝機能障害																																																																																																																																																																																																																																												
268	【UFT+LV療法】	<table border="1"> <thead> <tr> <th>レジメンと副作用</th> <th>1</th><th>8</th><th>15</th><th>22</th><th>29</th><th>36</th><th>43</th><th>50</th><th>56</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UFT (300mg/m<sup>2</sup>)</td> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>LV (75mg/m<sup>2</sup>)</td> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>嘔気・嘔吐</td> <td colspan="9"></td> </tr> <tr> <td>食欲不振</td> <td colspan="9"></td> </tr> <tr> <td>下痢</td> <td colspan="9"></td> </tr> <tr> <td>好中球減少</td> <td colspan="9"></td> </tr> <tr> <td>口内炎</td> <td colspan="9"></td> </tr> <tr> <td>色素沈着</td> <td colspan="9"></td> </tr> <tr> <td>手足症候群</td> <td colspan="9"></td> </tr> <tr> <td>肝機能障害</td> <td colspan="9"></td> </tr> </tbody> </table>	レジメンと副作用	1	8	15	22	29	36	43	50	56	UFT (300mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓	↓	↓	↓				LV (75mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓	↓	↓	↓				嘔気・嘔吐										食欲不振										下痢										好中球減少										口内炎										色素沈着										手足症候群										肝機能障害										<table border="1"> <thead> <tr> <th>レジメンと副作用</th> <th>1</th><th>7</th><th>8</th><th>14</th><th>15</th><th>21</th><th>22</th><th>28</th><th>29</th><th>35</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UFT (300mg/m<sup>2</sup>)</td> <td>↓↓↓↓↓</td><td>↓↓↓↓↓</td><td>↓↓↓↓↓</td><td>↓↓↓↓↓</td><td>↓↓↓↓↓</td><td>↓↓↓↓↓</td><td>↓↓↓↓↓</td><td>↓↓↓↓↓</td><td>↓↓↓↓↓</td><td>↓↓↓↓↓</td> </tr> <tr> <td>LV (75mg/m<sup>2</sup>)</td> <td>↓↓↓↓↓</td><td>↓↓↓↓↓</td><td>↓↓↓↓↓</td><td>↓↓↓↓↓</td><td>↓↓↓↓↓</td><td>↓↓↓↓↓</td><td>↓↓↓↓↓</td><td>↓↓↓↓↓</td><td>↓↓↓↓↓</td><td>↓↓↓↓↓</td> </tr> <tr> <td>嘔気・嘔吐</td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td>食欲不振</td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td>下痢</td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td>好中球減少</td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td>口内炎</td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td>色素沈着</td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td>手足症候群</td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td>肝機能障害</td> <td colspan="10"></td> </tr> </tbody> </table>	レジメンと副作用	1	7	8	14	15	21	22	28	29	35	UFT (300mg/m <sup>2</sup> )	↓↓↓↓↓	↓↓↓↓↓	↓↓↓↓↓	↓↓↓↓↓	↓↓↓↓↓	↓↓↓↓↓	↓↓↓↓↓	↓↓↓↓↓	↓↓↓↓↓	↓↓↓↓↓	LV (75mg/m <sup>2</sup> )	↓↓↓↓↓	↓↓↓↓↓	↓↓↓↓↓	↓↓↓↓↓	↓↓↓↓↓	↓↓↓↓↓	↓↓↓↓↓	↓↓↓↓↓	↓↓↓↓↓	↓↓↓↓↓	嘔気・嘔吐											食欲不振											下痢											好中球減少											口内炎											色素沈着											手足症候群											肝機能障害												11/03/22
レジメンと副作用	1	8	15	22	29	36	43	50	56																																																																																																																																																																																																																																			
UFT (300mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																						
LV (75mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																						
嘔気・嘔吐																																																																																																																																																																																																																																												
食欲不振																																																																																																																																																																																																																																												
下痢																																																																																																																																																																																																																																												
好中球減少																																																																																																																																																																																																																																												
口内炎																																																																																																																																																																																																																																												
色素沈着																																																																																																																																																																																																																																												
手足症候群																																																																																																																																																																																																																																												
肝機能障害																																																																																																																																																																																																																																												
レジメンと副作用	1	7	8	14	15	21	22	28	29	35																																																																																																																																																																																																																																		
UFT (300mg/m <sup>2</sup> )	↓↓↓↓↓	↓↓↓↓↓	↓↓↓↓↓	↓↓↓↓↓	↓↓↓↓↓	↓↓↓↓↓	↓↓↓↓↓	↓↓↓↓↓	↓↓↓↓↓	↓↓↓↓↓																																																																																																																																																																																																																																		
LV (75mg/m <sup>2</sup> )	↓↓↓↓↓	↓↓↓↓↓	↓↓↓↓↓	↓↓↓↓↓	↓↓↓↓↓	↓↓↓↓↓	↓↓↓↓↓	↓↓↓↓↓	↓↓↓↓↓	↓↓↓↓↓																																																																																																																																																																																																																																		
嘔気・嘔吐																																																																																																																																																																																																																																												
食欲不振																																																																																																																																																																																																																																												
下痢																																																																																																																																																																																																																																												
好中球減少																																																																																																																																																																																																																																												
口内炎																																																																																																																																																																																																																																												
色素沈着																																																																																																																																																																																																																																												
手足症候群																																																																																																																																																																																																																																												
肝機能障害																																																																																																																																																																																																																																												
270	【FOLFIRI+BV療法】5-FU (2,400mg/m <sup>2</sup> )	<table border="1"> <thead> <tr> <th>レジメンと副作用</th> <th>1</th><th>8</th><th>15</th><th>22</th><th>28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5-FU (400mg/m<sup>2</sup>)</td> <td>↓</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5-FU (2,400mg/m<sup>2</sup>)</td> <td>↓↓↓</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>	レジメンと副作用	1	8	15	22	28	5-FU (400mg/m <sup>2</sup> )	↓					5-FU (2,400mg/m <sup>2</sup> )	↓↓↓					<table border="1"> <thead> <tr> <th>レジメンと副作用</th> <th>1</th><th>8</th><th>15</th><th>22</th><th>28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5-FU (400mg/m<sup>2</sup>)</td> <td>↓</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5-FU (2,400mg/m<sup>2</sup>)</td> <td>↓↓↓</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td><td>→46時間</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>	レジメンと副作用	1	8	15	22	28	5-FU (400mg/m <sup>2</sup> )	↓					5-FU (2,400mg/m <sup>2</sup> )	↓↓↓							→46時間				赤字部分を修正	11/03/22																																																																																																																																																																																													
レジメンと副作用	1	8	15	22	28																																																																																																																																																																																																																																							
5-FU (400mg/m <sup>2</sup> )	↓																																																																																																																																																																																																																																											
5-FU (2,400mg/m <sup>2</sup> )	↓↓↓																																																																																																																																																																																																																																											
レジメンと副作用	1	8	15	22	28																																																																																																																																																																																																																																							
5-FU (400mg/m <sup>2</sup> )	↓																																																																																																																																																																																																																																											
5-FU (2,400mg/m <sup>2</sup> )	↓↓↓																																																																																																																																																																																																																																											
		→46時間																																																																																																																																																																																																																																										

第5章 抗がん剤投与手技の基本と注意

307	下から3行目	調整環境の汚染予防のために	調整環境の汚染予防のために	赤字部分を修正	11/03/22
309	上から2行目	クレーブオンコロジーシステム	ケモクレーブシステム		12/03/01