

正誤表・更新情報

本書中に訂正・更新箇所等がございました。お手数をお掛けしますが、下記ご参照頂けますようお願い申し上げます（2019年1月29日）

■第2版 第3刷（2018年9月20日発行）の修正・更新箇所

※第1刷からの修正箇所はhttps://www.yodosha.co.jp/correction/9784758117821_corrections.pdf をご参照ください

頁	場所	修正前	修正後	補足	掲載
第4章-5. 消化器がん A. 食道がん・胃がん・大腸がん 3: 大腸がん-②K-RAS野生型, 三次治療					
365	表「レジメンと副作用」		下五行分(末梢神経障害~高血圧脳症)を削除	※1参照	19/01/29

図表

※1

③大腸がん-②K-RAS野生型, 三次治療

【FOLFIRI + Cmab療法】^{17,18)}

- FN リスク：軽度
- 催吐性リスク：中等度

外来 2週ごと

📌 下痢に注意 (日)

レジメンと副作用	1	8	15	22	28
5-FU (400 mg/m ²) 急速静注 (5分)	↓		↓		
5-FU (2,400 mg/m ²) 持続静注 (46時間)	↓↓↓		↓↓↓		
I-LV (200 mg/m ²) 点滴静注	↓		↓		
CPT-11 (150 mg/m ²) 点滴静注	↓		↓		
セツキシマブ (初回400 mg/m ² , 2回目以降250 mg/m ²) 点滴静注	↓		↓		
嘔気・嘔吐	半円		半円		
食欲不振	半円		半円		
過敏症	半円		半円		
骨髄抑制	半円		半円		
口内炎	半円		半円		
手足症候群	半円		半円		
末梢神経障害	半円		半円		
消化管穿孔	半円		半円		
創傷治癒遅延	半円		半円		
出血・塞栓症	半円		半円		
高血圧脳症	半円		半円		

削除