

正誤表・更新情報


本書中に訂正・更新箇所等がございました。お手数をお掛けしますが、下記ご参照頂けますようお願い申し上げます（2017年7月13日）

■第1刷（2017年6月15日発行）の修正・更新箇所

頁	場所	修正前	修正後	補足	掲載
I 内分泌 第5章 副腎クリーゼ					
160	症例4下から1行目	心電図： 洞性頻脈	心電図： 洞性		17/06/21
174	図1	ACTH刺激試験の下の「 治療は 」を削除		下記図表※1参照	17/06/21
II 消化器 第1章 上部消化管出血					
277	上から5行目	95%信頼区間 3.6 -13.4%	95%信頼区間 -3.6 -13.4%		17/07/13
II 消化器 第2章 ストレス潰瘍予防					
288	下から1～2行目	95%信頼区間 0.19- 1.68	95%信頼区間 0.19- 0.68		17/06/21
II 消化器 第3章 食道静脈瘤					
298	症例6下から5行目	Glu 840 mg/dL	Glu 80 mg/dL		17/06/21
350	図2	尿素回路からの矢印が尿素を指すように位置を変更		下記図表※2参照	17/06/21
II 消化器 第4章 急性膵炎					
406	図2	「4週間以上経過」を下に移動		下記図表※3参照	17/07/13


図表

※1



*ヒドロコルチゾンは初回100 mg、2回目以降は50 mgを6時間おきに静注投与

※2



※3

