

正誤表・更新情報

本書中に訂正・更新箇所等がございました。お手数をお掛けしますが、下記ご参照頂けますようお願い申し上げます（2020年3月27日）

■第1刷（2020年3月10日発行）の修正・更新箇所

頁	場所	修正前	修正後	補足	掲載
薬剤編 41 高尿酸血症治療薬					
135	2. 同種薬の薬理作用の違い	<p>●高尿酸血症治療薬は尿酸産生抑制薬と尿酸排泄促進薬に大別される</p> <p>▶尿酸産生抑制薬：近位尿細管のURAT1阻害による尿酸の再吸収抑制作用を有する</p> <p>▶尿酸排泄促進薬：キサンチンオキシダーゼ阻害による尿酸生成抑制作用を有する</p>	<p>●高尿酸血症治療薬は尿酸産生抑制薬と尿酸排泄促進薬に大別される</p> <p>▶尿酸産生抑制薬：キサンチンオキシダーゼ阻害による尿酸生成抑制作用を有する</p> <p>▶尿酸排泄促進薬：近位尿細管のURAT1阻害による尿酸の再吸収抑制作用を有する</p>		20/03/27
137	5. 禁忌(5～8行目)	<p>●パラミジンの禁忌：アスピリン喘息もしくは、その既往がある症例、消化性潰瘍を有する症例</p> <p>●ユリノームの禁忌：妊婦もしくは妊娠している可能性のある症例、授乳中の症例</p>	<p>●ブコロームの禁忌：アスピリン喘息もしくは、その既往がある症例、消化性潰瘍を有する症例</p> <p>●ベンズプロマロンの禁忌：妊婦もしくは妊娠している可能性のある症例、授乳中の症例</p>	商品名を一般名へ変更	20/03/27