

正誤表

本書中に訂正箇所等がございました。訂正し、お詫び致します。お手数をお掛けしますが、訂正箇所を書き込んでお使いいただきますよう、お願ひ申し上げます。

(2011年6月22日作成)

<本正誤表掲載情報>

[P35] 第1刷(2011年7月15日発行)をおもちの方が必要な修正箇所

■第1刷(2011年7月15日発行)をおもちの方が必要な修正箇所

頁	場所	誤	正	補足	掲載
第Ⅰ部 第2章1 インフルエンザウイルス					
35 記	表1の一般名の表	ラニナビビル	ラニナミビル(※1表を参照)		11/06/22

図表

表 日本で認可されている抗インフルエンザウイルス薬					
一般名	アマンタジン	ザナミビル	オセルタミビル	ベラミビル	ラニナミビル
商品名	シンメトレル [®]	リレンザ [®]	タミフル [®]	ラビアクタ [®]	イナビル [®]
適応	A型	A型, B型	A型, B型	A型, B型	A型, B型
対象	成人	成人および5歳以上のお子様	成人および1歳以上のお子様	成人および小児	成人および小児
剤型	錠剤, 細粒	粉末	カプセル, ドライシロップ	注射剤	粉末
用法	経口	吸入	経口	点滴静脈内注射	吸入
用量	1日100 mgを1～2回に分割	1回10 mgを1日2回	成人は1回75 mgを1日2回 小児は1回2 mg/kgを1日2回	300 mgを単回 小児は10 mg/kgを単回	成人および10歳以上のお子様は40 mgを単回 10歳未満のお子様は20 mgを単回
副作用	興奮, めまい, 下痢, 発疹, 嘔吐, 下痢, 嘔吐など	嗅覚障害など	下痢, 悪心, 嘔吐など	下痢, 好中球減少, タンパク尿など	下痢, 悪心, ALT (GTP) 上昇など
耐性ウイルスの出現頻度	高い	少ない	少ない	不明	不明